XIV Congreso Nacional de Trabajo Social
Taller " TRABAJO SOCIAL Y LA PROMOCION PARA LA SALUD EN
LA CLINICA DE ATENCION INTEGRAL AL NIÑO MALTRATADO".

Manifestaciones visibles e invisibles
del maltrato infantil

Dra. Gloria Elena López Navarrete

5 de Octubre de 2006

Contenido

- Impacto
- Maltrato infantil. Definición
- Formas de maltrato
- **Maltrato físico**
- Evaluación clínica del niño con lesiones
- Indicadores de Maltrato físico
- Diagnóstico diferencial
- Equipo interdisciplinario
- Prevención

Impacto de la violencia

- La violencia es un problema generalizado que ocasiona pérdidas significativas en materia de salud y economía a escala familiar, comunitaria y nacional.
- América Latina: alrededor de seis millones de niños y adolescentes sufren violencia grave y mueren al año cerca de 80 mil producto de la violencia intrafamiliar.

El impacto de la violencia intrafamiliar en la probabilidad de violencia intergeneracional, la progresión escolar y el mercado laboral en México. En: Marie Knaul F, Nigenda G. Caleidoscopio de la salud. Fundación Mexicana para la Salud 2003, México.

Buvinic M, Morrison A, Shifter M. Violence in Latin America and the Caribbean. A framework for action.

Washington, D.C. tchnical study, sustainable. Development Departament, inter-american development Bank. 2000

- 10% de cualquier comunidad pediátrica
- 1 de cada 10 niños maltratados es reportado
- 1 de cada 100 reportados es atendido de manera integral

- El maltrato infantil impide que niños y adolescentes alcancen su máximo desarrollo en el ambiente escolar, social y laboral.

- Menores víctimas Adultos agresores
Transmisión intergeneracional de la violencia.

Alvarado-Saldivar G, Moysén JS, Estrada Martínez S, Terrones González A. Prevalencia de la violencia doméstica en la ciudad de Durango. Salud Pub Mex 1998; 40; 481-486

Heise LL. Violence Against women; the hidden health burden. Washington D.C. The World Bank, 1999

El Maltrato al Menor Un Problema de Salud Pública en el Mundo

**Organización Mundial de la Salud. Lancet 1999; 353:
1340**

Maltrato al menor

Definición

- ONU
- UNICEF
- ESPAÑA
- FRANCIA
- ECUADOR
- MEXICO
- DIF
- CAINM INP
- *KEMPE*
- *MARCOVICH*
- *LOREDO A. & COLS.*

Toda agresión u omisión intencional, dentro o fuera del hogar, contra un menor (es), antes o después de nacer, que afecte su integridad biopsicosocial, realizada habitual u ocasionalmente por una persona, institución o sociedad, en función a su superioridad física ido intelectual.

CAINM-INP

Niño
Producto no aceptado
Malformaciones
Enfermedad crónica
Lesión neurológica
Trastorno por déficit de
Atención e Hiperquinesia

MALTRATO

Agresor
Parentesco
Género
Alcoholismo
Adicción a sustancias

Detonante
Desempleo
Disfunción conyugal
Antecedente de maltrato
Familia con mas de
tres hijos

Triada del maltrato infantil

Formas de Maltrato

Conocidas

- Maltrato físico
- Abuso sexual
- Maltrato emocional
- Niños en situación de Calle

Poco Conocidas

- Síndrome Niño Sacudido
- Síndrome de Munchausen
- Abuso Fetal

Poco Conceptualizadas

- Ritualismo satánico
- Maltrato étnico
- Niños de la guerra

TIPOS DE MALTRATO INFANTIL.

- M. FÍSICO.
- ABUSO SEXUAL.
- M. PSICOLÓGICO.
- Sx MÜNCHAUSEN.
- Sx NIÑO SACUDIDO.
- RITUALISMO.

252 niños con SNM

El niño con lesiones ¿Accidente o maltrato?

Conceptos

Castigo corporal

- Método disciplinario
- Usa fuerza física.
- Modificar la conducta.

- Patrones de conducta.
- Patrones culturales.

- EU:
90% padres.
60% maestros.

Maltrato físico

Definición

- Es la lesión externa o interna presente en un niñ@ o adolescente como consecuencia de un fenómeno de violencia intencional.

CAINM-INP

Tipos de maltrato físico

- Traumatismo directo
- Ahogamiento
- Asfixia
- Envenenamiento
- Síndrome del niño sacudido

Tipos de lesiones

- Petequias-equimosis-hematomas.
- Quemaduras
- Escoriaciones.
- Mordeduras.
- Zonas de alopecia.
- Cicatrices.
- Fracturas

Loredo Abdalá A, Trejo HJ, Galván RE. Maltrato físico. En: Loredo Abdalá A. Maltrato en niños y adolescentes. Editores de textos mexicanos. México, 2004.

Ballona R, Chacón O, Zaldivar E: Manifestaciones cutáneas del maltrato infantil. *Dermatol Pediatr Lat* 2003;1:24-29.

Fernandez CG, Peres CJ: Síndrome de niño maltratado. *Hospital Pediátrico Universitario "Juan M Márquez"*. Habana Cuba.

Calvo FJ, Calvo FM, Calvo RJ: Malos tratos infantiles. *Canarias Pediatría* 2000;24:47-56.

Características de las lesiones

Accidentales

- Son frecuentes en el niño mayor
- Se observan en frente, mentón y extremidades.
- Localización sobre prominencias óseas (codo, hombro, rodilla, etc.)
- Unilaterales

Intencionales

- Presentes antes de que el niño deambule.
- Localización en sitios no visibles: espalda, glúteos, genitales, etc.
- Reflejan una imagen específica. (mordedura, cigarrillos, hebilla de cinturón, etc.)
- Bilaterales

Color de la piel posterior a la lesión

Tiempo	Color
< 1 día	Rojo-Azul oscuro
1 a 5 días	Violáceo
5 a 7 días	Rojo-púrpura
7 a 10 días	Verdoso
2 a 4 semanas	Amarillento

Trejo HJ, Rodríguez HR, García PC. Maltrato físico. En: Guía de Diagnóstico y Tratamiento en Pediatría. Editorial Doyma, 2004.

Wilson EF. Estimation of the age of cutaneous contusions in child abuse. Pediatrics 1977; 60:750-752.

Mordeduras

Cuando son producidas por un adulto:

- Localización en cara y extremidades.
- Se dibuja la arcada dentaria.
- La distancia entre los caninos es mayor de 3 cm.

Quemaduras

- Por un liquido (escaldadura)
- Contacto con superficie caliente (seca)

- **Escaldadura por inmersión**
- Cuando el contacto de la piel dura mas de 70 seg. a una temperatura de 52 grados C. y deja lesiones profundas son producidas intencionalmente, se requiere de menor tiempo y la lesión no es tan profunda en casos accidentales.

Características de las quemaduras

Por escaldadura intencional

Bordes	Nítidos
Salpicaduras	Ausentes
Forma	Guante, calcetín.
Profundidad	Homogénea
Grado	1ero. a 2do.
Simetría	Bilateral

Por contacto intencional

- Forma del objeto; plancha, radiador, cigarrillo
- Bordes; nítidos.

Fracturas

- Respuesta ósea a fuerzas aplicadas

FASE ELÁSTICA.

FASE PLÁSTICA.

**FUERZA SUPERIOR A RESISTENCIA.
FRACTURA.**

- Factores extrínsecos (altura de la caída, tipo de superficie, velocidad y magnitud de la fuerza empleada)
- Factores intrínsecos (propiedades estructurales)

Loredó Abdalá A, Trejo HJ, Galván RE. Maltrato físico. En: Loredó Abdalá A. Maltrato en niños y adolescentes. Editores de textos mexicanos. México, 2004.

Clyde PM, Bertocci GE, Vogeley E: Evaluating long bone fractures in children: a biochemical approach with illustrative cases. Child Abuse & Neglect. 2004;28:505-524.

■ Localización.

■ Forma.

■ Antigüedad.

■ Multiplicidad.

•Alta especificidad

Lesión metafisiaria
Costales posteriores
Escápula
Esternón
Fractura helicoidal
Procesos espinosos

- **Baja especificidad**

Fractura clavicular
Fractura lineal de cráneo
Fracturas lineales en
Huesos largos

- **Moderada especificidad**

Fracturas múltiples
En cuerpos vertebrales
En diversos estadios de
evolución.
Levantamientos epifisarios

Síndrome del niño sacudido

- Forma grave de maltrato infantil
- Afecta principalmente a menores de 5 años
- Sospecha en niños con afectación neurológica grave
- Resultado de la aceleración rotacional extrema inducida por sacudidas violentas ó impacto craneal

Características básicas

- Hemorragia intracraneal (subdural y subaracnoidea) 72%
 - Hemorragia retiniana y/o desprendimiento 90%
 - Lesión osteoarticular (Fracturas costales, huesos largos, cervicales)
- Ausencia o escasa evidencia de lesiones externas

Mortalidad

- 15 a 38% .
- 60% en estado de coma inicial.

Secuelas

- Morbilidad severa 60 – 70%
- Amaurosis, epilepsia y retraso mental grave

Otras lesiones

- **Graves**
 - Lesiones viscerales
 - Puñetazos o patadas.
 - 2da causa de muerte.
-
- Heridas cavidad bucal.
 - Avulsión dentaria.
 - Rotura de frenillo dental.
 - Fractura huesos propios de la nariz.
 - Hemorragia timpánica.

Evaluación clínica del niño con lesiones

- Interrogatorio al menor
- Entrevista a los padres y/o cuidadores
- Mecanismo documentado de la lesión
- Antecedentes médicos del niño (lesiones)
- Evaluación nutricia
- Historia familiar
- Historia social

Indicadores de maltrato físico

- **Loredo Abdalá A. Trejo Hernández J, Castillo Serna L. Diagnosis of physical child abuse: Clinical and social indicators. Bol Med Hosp Infant Mex 2003; 60: 263-272**

Indicadores clínicos en el niño

Primer orden	Discordancia clínica
Segundo orden	Talla baja Higiene inadecuada Bajo rendimiento escolar
Tercer orden	Lesiones antiguas Desnutrición Producto no deseado o aceptado Inmunizaciones incompletas

Indicadores clínicos en la familia

Primer orden	Retardo en la atención médica
Segundo orden	Historia de maltrato en los padres Convivencia con padrastros
Tercer orden	Maltrato en otro familiar Alcoholismo y drogadicción en alguno de los padres Solicitud de atención por una persona ajena al núcleo

Situaciones poco habituales

- Cuando el menor señala al posible agresor.
- El agresor acepta su culpabilidad y solicita ayuda especializada.
- Existen testigos que denuncian los hechos.

Diagnóstico diferencial

- Lesiones accidentales
- Enfermedades óseas
- Enfermedades de la piel
- Metabólicas
- Infecciosas
- Culturales

Síntomas y signos

- Alteraciones del lenguaje
- Problemas de aprendizaje
- Crecimiento y desarrollo alterados
- Trastornos del sueño
- Trastornos de alimentación
- Desordenes funcionales y somatización
- Problemas emocionales

Recomendaciones

- No realizar prematuramente el diagnóstico de maltrato.
- Evitar agredir a los padres.
- Realizar notificación médico legal de las lesiones.
- Valorar la necesidad de hospitalización.

Manejo interdisciplinario

Prevención del maltrato infantil

- ¿Es factible prevenir el maltrato infantil?
- Prevención primaria
 - *“Vacúnate simbólicamente contra la violencia”*
- Prevención secundaria
- Prevención terciaria

Gracias

Dra. Gloria E. López Navarrete
glopez29@yahoo.com